

in de regel slechts eenmaal gebruikt en derhalve meestal ieder jaar een nieuw bouwt, is het a priori niet te verwachten dat deze roofvogel kunstnesten zal aannemen. Dat ook hier enige manipulaties met betrekking tot de nestplaats mogelijk zijn, bewijst het volgende experiment.

In een reeds jaren door Sperwers bewoond gebied werd begin april 1974 vastgesteld, dat een nieuw nest laag boven een druk belopen pad werd gebouwd. Op 15 april werd dit nest door ons uit de boom verwijderd. Om een nieuw bouwsel op dezelfde plaats onmogelijk te maken werden de takken waarop het gesteund had afgebroken. Op 40 m afstand, maar eveneens vlakbij de door prooiresten en uitwerpselen gemarkeerde roestplaats van de Sperwers, werd het nest vervolgens op 6 m hoogte in een vanaf de roestplaats goed te bereiken boom geplaatst. Hoewel de omvang van het horst tijdens deze operatie bijna was gehalveerd, bleek op 27 april dat het nest was afgebouwd en de eerste eieren reeds waren gelegd. Er vlogen 4 jonge Sperwers uit.

SUMMARY

In some breeding areas of the Goshawk *Accipiter gentilis* the only available nest, situated close to a frequently used forest track, was rendered unusable. Subsequently an artificial nest was presented, which was accepted by the hawks. An eyrie of the Sparrowhawk *Accipiter nisus*, also situated very conspicuously, was successfully transplanted shortly before egg-laying.

Adres: Zoölogisch laboratorium afd. dieroecologie, Toernooiveld, Nijmegen.

WAARNEMING VAN STEPPENKIEVIT *CHETTUSIA GREGARIA* (PALLAS) BIJ HET NATUURRESERVAAT „DE GROOTE PEEL” OSPEL (L)

Observation of a Sociable Plover near Ospel

M. H. VAN DEURSEN

Op zaterdag 11 mei 1974 te omstreeks 8.15 uur kwam de heer L. Verstappen uit Meijel mij mededelen, dat er een plevierachtige vogel (een volgens hem witte Kievit) op een weiland langs de Moostdijk zat. Het aangewezen gebied is gelegen en grenzend aan de z.w. zijde van het Natuurreservaat „De Groote Peel”, en gelegen onder de gemeente Nederweert.

Het is een open gebied hoofdzakelijk bestaande uit bouw- en weilanden, alleen langs de wegen staan ca 15 jarige eiken en andere bomen, en ter plaatsen broeden Kieviten, Grutto's, Wulpen, Scholekster en andere vogels.

Nadat wij (L. Verstappen, M. Verstappen en de auteur, ons naar bovengenoemde plaats hadden begeven, zagen wij vanuit de auto één grote witte (lichte) plevierachtige vogel met een duidelijk zwarte kruin en een zwarte oogstreep, zijn buik was duidelijk donker bruin (al deze kenmerken werden duidelijk gezien door een kijker 12 X 50).

In het vogelboek „Kist” 10e druk, op plaat 66, bij de zeldzaamheden,



Fig. 1. Steppenkievit. Deze foto werd genomen door de eerste waarnemer L. Verstappen.
Sociable Plover. Photograph, L. Verstappen.

zagen wij duidelijk dat wij met een Steppenkievit te maken hadden. Op zondag 12 mei werd de vogel nog gezien door L. Verstappen uit Meijel in de zelfde omgeving. Op maandag 13 mei om 11 uur zag de heer Overstegen uit Son de Steppenkievit nog geruime tijd langs de Moostdijk op een akker, en tegen de avond zag ik de vogel op een akker gelegen langs de Moostdijk op ca 200 meter van mijn huis.

De heren J. de Haan en P. Spreuwenberg uit Weert, en L. v. d. Homberg uit Venlo zagen deze vogel nog geruime tijd op zaterdag 11 mei, in de zelfde omgeving.

Gedragingen: De vogel liep meestal haastig een 10- tot 15-tal pasjes en bleef dan even stil staan. Soms ging hij naast een ♀ Kievit zitten. Wanneer een Kievit ♂ op hem stootte, vloog hij ca. 100 tot 150 meter weg. Hij was gewoonlijk te zien op een kaal weiland en op een pas ingezaaide akker. Ook werd vaak een zacht geluid gehoord zoals: grut, grut, of gret, gret. De vogel was in het algemeen niet schuwer dan een Kievit en liet zich in het begin benaderen tot op ca. 50 à 100 meter. De foto werd genomen vanuit een personenauto op ca. 50 meter afstand, door de eerste waarnemer L. Verstappen.

Volgens de Avifauna's van Brabant en Limburg (Hens) en het Inventarisatie Rapport over vogels van „De Groote Peel”, werd de soort nog niet eerder in Zuid-Nederland waargenomen.

Volgens de Avifauna van Nederland 1970 blz. 33 zijn twee gevallen van

een waarneming van de Steppenkievit bekend, één vondst en één waarneming resp. 21 april 1925 (Beers, v. Oort 197) en 8 oktober-16 november 1961 Opmeer N.H. (Vogeljaar 9: 275, Limosa 36: 21).

Vermeldenswaard is dat in sommige vogelboeken de afbeeldingen van de Steppenkievit veel te donker en te bruin worden weergegeven.

Voorkomen: Dwaalgast (3 ×; 1925 en 1961 en 1974). Vogel van Europees Rusland en Azië, Dwaalgast in Z. Europa W. tot Spanje, Gr. Brittannië, Ierland, België, Denemarken en Finland.

C.N.A.: bevestigde waarneming.

Adres: Moostdijk 8, Ospel.

WAARNEMING VAN EEN TEREK RUITER *TRINGA TEREK* IN HET BALGZAND

Observation of a Terek Sandpiper *Tringa terek* in Balgzand

M. FRANSSSEN en G. HOORNSMAN

Op 26 april 1973 namen wij in het Balgzand een Terek Ruiter waar, waarvan de bijzonderheden hieronder volgen.

Onmiskenaar opgewipte snavel, die dadelijk in het oog viel. De kleur was donker en tekende zich duidelijk af tegen de lichtere achtergrond. Pootjes meer oranje-achtig dan vleeskleurig (zoals in de determineerboekjes staat). Opvallend grijze stuit met donkere dwarsbanden en bruinachtige staart. Opvallende zwarte strepen, die als het ware naar elkaar toe lopen. Aan de flanken witachtig of gebroken wit. De afbeelding in „Elseviens Grote Vogelboek” pag. 121 zomerkleed komt het meest nabij onze waarneming. Hij fourageerde op het schor in een slenkje, vloog weg in NO-richting; duidelijk zagen wij toen, dat hij aan de borstzijde lichtelijk gestreept was.

C.N.A.: bevestigde waarneming; dit is het 4e geval.

Adres: Lupinestraat 16, Den Helder.

TWEE BROEDGEVALLEN VAN DE DRAAIHALS IN MEIJENDEL

Two breeding cases of the Wryneck in Meijendel

R. WANDERS

Op 8 mei 1974 werden voor het eerst dit jaar twee roepende Draaihalzen door ons gehoord. Het leek hier niet te gaan om een serieuze poging een territorium af te bakenen, maar meer om exemplaren die hier tijdelijk verbleven tijdens hun trek naar het broedgebied. Toen de heer A. Troost echter in de laatste week van mei een nest van de Draaihalz vond in de buurt waar wij één van beide dieren voor het laatst hadden gehoord, bleek dat dit roepen wel degelijk een functie had gehad. Dit eerste nest zat op ongeveer drie meter