

EEN AMERIKAANSE GESTREEPTE STRANDLOPER
CALIDRIS MELANOTOS AAN HET LAUWERSMEER

An American Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* near the Lauwersmeer

J. A. LOTERIJMAN EN C. P. SIKKEMA

In het voorafgaande artikel beschreven wij met Mej. L. G. Groen en H. F. de Boer de waarneming van een Grijszandloper aan een strandplas bij de westelijke oever van het Lauwersmeer tussen Oostmahorn en de afsluitdijk (gem. Oostdongeradeel, Friesland), van 4 t/m 7 september 1971 (de Boer e.a. 1972). Bij de waadvogels, die hier fourageerden, merkte één onzer op 4 september tevens een ongewone strandloper op in een groepje, dat op het eerste gezicht uit vijf Krombekstrandlopers leek te bestaan. Eenzelfde vogel werd ook op 5 en 6 september waargenomen, waarbij een vergelijking kon worden gemaakt met zowel de Krombekstrandloper als de Bonte Strandloper. De vogel was iets kleiner dan de Krombek-, maar iets groter dan de Bonte Strandloper en vooral ook slanker dan de laatstgenoemde. De rugtekening was „geschubd” door lichtbruine veerranden aan de donkerbruine vleugeldekveren, die een dubbele lichte „V” vormden ongeveer als bij de Kleine Strandloper. Deze dubbele „V” was duidelijk zichtbaar als de vogel van achteren op de rug werd gezien, maar onduidelijk van terzijde. De kleurtekening van de borst leek veel op die van Temmincks Strandloper: een vrij effen grijsbruine doorlopende band, die aan de onderkant vrij scherp was afgesneden van de witte onderzijde. Het wit van de onderzijde liep omhoog bij de vleugelboeg ongeveer als bij de Oeverloper. De kop was vrij klein en de hals tamelijk slank. Opvallend was de lichte wenkbrauwstreep. De snavel was korter dan die van de Bonte Strandloper en vrijwel recht, maar iets omhoog gebogen als bij Temmincks Strandloper. De pootkleur werd genoteerd als okergeel. Op 6 september, toen ook H. F. de Boer de vogel waarnam, beoordeelde deze de kleur van de poten als oranjegeel. Op grond van deze kenmerken kwamen wij tot de determinatie van een Amerikaanse Gestreepte Strandloper *Calidris melanotos*. Daarbij werd de mogelijkheid van de op deze soort veel gelijkende Siberische Gestreepte Strandloper *Calidris acuminata* uitgesloten op grond van de okergele pootkleur en de vrij scherpe begrenzing tussen de bruinigrijze borst en de witte onderzijde.

Van de Amerikaanse Gestreepte Strandloper worden in de Avifauna van Nederland (1970) drie bevestigde en twee onbevestigde waarnemingen vermeld. Daarna zijn bekend geworden: 28 sept. t/m 5 okt. 1969 Gr. IJ-polder C.N.A.: bev. waarn. (Limosa 45 : 73) en 21 mei 1971 Knardijk C.N.A.: onbev. waarn. (Archief CNA).

C.N.A.: bevestigde waarneming.

SUMMARY

An American Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* has been observed in the Northern part of the Netherlands ($53^{\circ}23'33''$ N, $6^{\circ}9'25''$ E) on 4th, 5th and 6th September 1971, at a pond near the Western shore of the Lauwersmeer, a lake which originated from the Lauwerszee estuary after the closing by a dike in 1969. The bird showed a rather even greyish-brown upper breast rather sharply cut from the white underparts. The white colour of the lower breast extended upwards along the front edge of the wings, this pattern resembling that of the Common Sandpiper. The legs were ochre-coloured. Simultaneously with the American Pectoral Sandpiper a Dowitcher has been observed, which is described in the previous paper (de Boer et al. 1972).

LITERATUUR

De Boer, H. F., L. G. Groen, J. A. Loterijman en C. P. Sikkema 1972. Een Grijs Snip *Limnodromus* bij het Lauwersmeer. *Limosa* 45: 186-189.

Adres: Dr. C. P. Sikkema, p/a Natuurkundig Laboratorium, Westersingel 34, Groningen.