

## Vangst van Cetti's Zanger (*Cettia cetti*) op Nederlands grondgebied

door

H. LEHAEN

(First record of *Cettia cetti* in the Netherlands)

Zoals vermeld in Limosa (41: 27) wordt sedert enkele jaren het landgoed „De Hoort”, dat deels op Belgisch, deels op Nederlands grondgebied — in de gemeente Budel, N.Br. — is gelegen, geïnventariseerd door een vogelwerkgroep uit Neerpelt, provincie Limburg, België.

Op 6 oktober 1968 werd daar door mij, in aanwezigheid van de heren G. Keunen en L. Theuwis, op Nederlands gebied ongeveer 20 m van de Belgische grens, een vogel gevangen, die me op het eerste gezicht een Snor (*Locustella luscinioides*) leek te zijn. Daarvoor was deze echter te klein, terwijl hij opmerkelijk korte vleugels had. Tevens was de rug donker rosbruin en waren de onderdelen grijsachtig wit met bruine randen, het staarteinde sterk afgerond en was er een vuilwitte bovenoogstreep aanwezig. Wij kwamen daardoor tot de conclusie, dat we met een Cetti's Zanger (*Cettia cetti*) te doen hadden, van welke soort hetzelfde jaar bovendien een broedvogel was geconstateerd te St. Truiden, dat in Belgisch Limburg op 48½ km van de vangplaats is gelegen, zodat we de soort in deze streek mochten verwachten.

De vogel werd geringd, terwijl als bewijsmateriaal foto's en dia's werden gemaakt; hij maakte geen geluid.

*Naschrift van de Redactie.* Het geval werd inmiddels door de C.N.A. aangevaard, waarmee dus wederom een nieuwe soort aan de Nederlandse lijst is toegevoegd, aangezien het hier een eerste waarneming betreft.


Deze volgens de Atlas van Voous Z.W.-palearctische soort heeft zich de laatste tijd sterk noordwaarts uitgebreid; vóór 1930 lag in Frankrijk de grens ongeveer bij de Loire; zie o.a. ook het kaartje van Huyskens in zijn artikel „De Noordwaartse doorbraak van de Cetti's Zanger” (De Wielewaal 34 (1968): 1—9). H. Wille (ibidem: 77) zoekt de voornaamste oorzaak van de uitbreiding in Spanje en Frankrijk in de droogte: „Overal waar wij uitdroging en zagezegde 'verbetering van waterzieke' gronden konden bijwonen, nam *Cettia cetti* spoedig de plaats in van de talrijke echte moerasvogels die hier telkens verdwenen”.

Voor België vermeldt de Avifauna (De Giervalk 57: 345) 1962 als eerste waarnemingsjaar, terwijl daar het eerste broedgeval in 1964 viel. Voorts schat Wille (l.c.), dat in 1967 in een gebied in Henegouwen reeds minstens 7 paar broedden. (t.K.).

### SUMMARY:

*Cetti's Warbler, new to the Dutch list.*

On October 6th, 1968 a specimen of Cetti's Warbler was caught in the Province of Noord-Brabant, at Budel near the Belgian frontier. This is the first record for the Netherlands. In the same year a pair of these Warblers had nested in Belgium, about 30 miles more to the south, at St. Truiden.



Cetti's Zanger (*Cettia cetti*). Budel, N.Br., landgoed „De Hoort”, 6 oktober 1968.

Foto's LEHAEN