



Foto dr. F. K. MÖLLRING

Een van de beide „Blauwe” Sneeuwganzen tussen Grauwe Ganzen. Oostelijk Flevoland, Knardijk, 11 oktober 1966.

*STEPPENKIEKENDIEF (Circus macrourus) IN NOORD-BRABANT (**).*

Op 22 oktober 1966 ondernam ik met mijn echtgenote een vogelexcursie naar de Strabrechtse heide en wel naar het Z.W. gedeelte, grenzend aan het gehucht Kreil (gem. Heeze). Het bleek een gunstige roofvogeldag: in de loop van ca 1½ uur namen wij waar 2 Buizerds, 1 ♀ Sperwer, 1 Torenvalk en 1 ♀ Blauwe Kiekendief. Om ca half vier zagen we plotseling op ongeveer 400 m afstand een grote, zeer lichte vogel laag over de heide vliegen.

Het vliegbeeld en de vliegwijze wezen er duidelijk op, dat wij hier met een

Kiekendief te doen hadden. Het opvallendste aan de vogel was zijn bijna witte verenkleed, dat veel lichter was dan van de ♂ van de Blauwe Kiekendief, welke ik in de omgeving van Eindhoven reeds enkele malen waarnam. De onderzijde was nagenoeg wit, de bovenvleugels en staart waren zeer licht effen blauwachtig grijs. De vogel maakte een wittere indruk dan bijv. een Kokmeeuw en stak ook wit af tegen de stammen van enkele berken, waarvoor hij neerstreek op ca 150 m afstand. De handpennen waren donker en staken met name tegen de ondervleugels zwart af. De vleugelpunten waren voor een Kiekendief tamelijk spits. Uiteraard ging onze aandacht speciaal uit naar de stuit van het dier. Het bleek, dat deze dezelfde of nagenoeg dezelfde kleur had als vleugels en staart. Van een witte stuit, zoals het ♂ van de Blauwe Kiekendief bezit, was geen sprake.

Bovenstaande kenmerken brachten ons, na raadpleging van de beschikbare determinatiewerken, tot de conclusie dat het hier een waarneming van de Steppenkiekendief (*Circus macrourus*) betrof.

Gedurende 10 minuten konden wij de Kiekendief waarnemen, zowel in de zit als alle mogelijke vliegstanden tijdens zijn normale jachtwijze en tijdens een „luchtgevecht” met enkele aanvallende Kraaien. De gebruikte kijkers waren een 7 x 50 en een 10 x 50; de kortste waarnemingsafstand bedroeg ongeveer 150 m. De volgende dag werd het terrein vanwege het slechte weer niet bezocht; de daarop volgende twee dagen werd het telkens gedurende ca 1½ uur tevergeefs afgezocht.

Eindhoven.

P. P. H. Hallmann.

SUMMARY:

New record of the Pallid Harrier

On October 22nd, 1966 a male of the Pallid Harrier was seen in the surroundings of Heeze, Province of Noord-Brabant.

STEPPEVORKSTAARTPLEVIER (*Glareola nordmannii*) AAN DE KNARDIJK (**).

Toen wij ons op 16 augustus 1966 aan de Knardijk bevonden, ter hoogte van paal 17.5, vernamen we ineens een vreemd geluid, klinkend als „kru-iek” of „kwiek” (het laatste deel hoog en oplopend) en zagen vanuit het Z.O. op ca 20 m boven het riet een vreemde vogel in onze richting vliegen. Meteen vielen het sternachtige voorkomen, de zwevende, lichte vleugelslag, de lange spitse vleugels, de lichte buik en de donkere ondervleugels op. Bult, die in het voorjaar en de zomer van hetzelfde jaar in de gelegenheid was Vorkstaartplevieren (*Glareola pratincola*) in het buitenland waar te nemen, herkende de vogel vrijwel direct als een Vorkstaartplevier (*Glareola* sp.). De vogel vloog op ca 30 m aan ons voorbij en ging verder in westelijke richting. Hij cirkelde even rond en leek daarbij insecten te vangen. Na zeer ver ongeveer evenwijdig aan de dijk te hebben gevlogen, kruiste hij deze en begon over het